प्रश्न पुस्तिका / QUESTION BOOKLET विषय / Subject : सहायक भू संरक्षण (कृषि)

कोड / Code: 94

110013

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या /

Number of Pages in Booklet: 32

विषय कोड 94

बुकलेट सीरीज

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या /

Number of Questions in Booklet: 100

समय / Time : 2 घंटे / Hours

पूर्णांक / Maximum Marks : 100

INSTRUCTIONS

- 1. Answer all questions.
- 2. All questions carry equal marks.
- 3. Only one answer is to be given for each question.
- 4. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- 5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- 6. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. (A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.)
- 7. The candidate should ensure that Series Code of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same after opening the envelopes. In case they are different, a candidate must obtain another Question Paper of the same series. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.
- 8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 marks will be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
 - Warning: If a candidate is found copying or if any unauthorised material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted under Section 3 of the R.P.E. (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992. Commission may also debar him/her permanently from all future examinations of the Commission.

निर्देश

- 1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- 2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
- 4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा ।
- 5. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया हैं। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल म्वाइंट ऐन से गहरा करना है ।
- 6. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से हैं। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- 7. प्रश्न-पत्र पुरितका एवं उत्तर पत्रक के लिफाफे की सील खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुरितका पर वही सीरीज अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है। इसमें कोई भिन्नता हो तो वीक्षक से प्रश्न-पत्र की ही सीरीज वाला दूसरा प्रश्न-पत्र का लिफाफा प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर जिम्मेदारी अध्यर्थी की होगी।
- 8. मोबाईल फोन अथवा इलेक्ट्रोनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानी पूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से अनिवार्य रूप से कार्ट जाएंगे।

चैतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी और आर. पी. ई. (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही आयोग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली आयोग की समस्त परीक्षाओं से विवर्णित

1

[∓]∧₄ ѧ₁ ‴

[Contd...

94_A]

1	The best soil structure for favor	urable ph	ysical properties is :
	(1) Crumby and gramular	(2)	Platy and laminar
	(3) Columnar and prismatic	(4)	Blocky
	मृदा के अनुकूल भौतिक गुणों के लि	ए सर्वोत्तम	। मृदा संरचना है :
	(1) मृदुकणीय एवं कणीय	(2)	प्लेट सदृश एवं स्तरीय
	(3) स्तम्भाकार एवं प्रिज्मीय	(4)	खण्ड सदृश
2	The natural aggregates of soil a	re know	n as :
	(1) peds	(2)	clods
	(3) fragments	(4)	gravels
	मृदा के प्राकृतिक समुच्चय कहलाते है	; ;	
	(1) पैड	(2)	ढेले
	(3) खण्ड	(4)	कंकड़
3	The degree to which a soil resitermed as:	ists defor	rmation when a force applied is
	(1) Field capacity	(2)	Capillary capacity
	(3) Consistency	(4)	Friability
	बल लगाने पर मृदा में उत्पन्न विरूपत	ग का प्रति	रोध करने की अवस्था को कहते हैं:
	(1) क्षेत्र धारिता	(2)	केशीय क्षमता
	(3) गाढ़ता	(4)	भुरभुरापन
4	The soil has porosity of 40%,	its void	ratio is -
	(1) 0.60	(2)	1.50
	(3) 0.40	(4)	0.67
	मृदा की सरन्ध्रता 40% है तो इसक	ज रन्ध्र अ	ानुपात होगा –
	(1) 0.60	(2)	1.50
	(3) 0.40	(4)	0.67
94_	A]	2	[Contd

5	The following soil water is held of	lue to	adsorption forces -
	(I) Gravitation water	(2)	Capillary water
	(3) Hygroscopic water	(4)	Hygroscopic and capillary water
	निम्न मृदा जल अधिशोषित बलों द्वारा	धारित	रहता है
	(1) गुरुत्व जल	(2)	केशिका जल
	(3) आर्द्रताग्राही जल	(4)	आर्द्रताग्राही एवं केशिका जल
6	The rate of decomposition of lign	ins an	nd phenolic compounds is:
	(1) Rapid	(2)	Very slow
	(3) Slow	(4)	Medium
	लिग्निन एवं फिनोलिक यौगिकों की अप	घटन ।	(विच्छेदन) गति होती है :
	(1) शीघ	(2)	बहुत धीमी
	(3) धीमी	(4)	मध्यम
7	The decomposition of organic mat	ter in	soil reduces :
	(1) Acidity	(2)	Alkalinity
	(3) Fertility	(4)	Salinity
	मृदा में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन (ि	वेच्छेदन) से कम होती है :
	(1) अम्लीयता	(2)	क्षारीयता
	(3) उर्वरता	(4)	लवणीयता
8	The suitable nitrogen fertilizer for	sodic	(Alkali) soils is:
	(1) Sodium nitrate	(2)	Ammonium sulphate
	(3) Urea	(4)	Ammonium chloride
	क्षारीय मृदाओं के लिये उपयुक्त नाइट्रोज	नन उर्व	रिक है:
	(1) सोडियम नाइट्रेट	(2)	अमोनियम सल्फेट
	(3) यूरिया	(4)	अमोनियम क्लोराइड
			·
94_ <i>A</i>	A] 3		[Contd

9 The SAR (Sodium Adsorption Ratio) of irrigation water is calculated with the help of following formula (concentrations of ions in me/I):

(1)
$$SAR = \frac{Mg^{++}}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}}$$
 (2) $SAR = \frac{Na^{+}}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}}$

(3)
$$SAR = \frac{Ca^{++}}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}}$$
 (4) $SAR = \frac{Na^{+}}{\sqrt{\frac{Na^{+} + Mg^{++}}{2}}}$

सिंचाईजल के एस ए आर (सोडियम अधिशोषण अनुपात) की गणना निम्न में से किस सूत्र की सहायता से की जाती है ? (आयन्स की मात्रा मिली इक्विवैलैंट प्रति लिटर)

(1)
$$\forall \theta \ \forall \exists \tau = \frac{Mg^{++}}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}}$$
 (2) $\forall \theta \ \forall \exists \tau = \frac{Na^{+}}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}}$

(3) एस ए आर =
$$\frac{Ca^{++}}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}}$$
 (4) एस ए आर = $\frac{Na^{+}}{\sqrt{\frac{Na^{+} + Mg^{++}}{2}}}$

10 Which of the following is a safe limit of RSC (Residual Sodium Carbonate) of irrigation water proposed by Eaton (1950) ?

(1)
$$< 1.25 \, me/l$$

(2)
$$> 2.5 me/l$$

(3)
$$< 5 me/l$$

$$(4) > 7.5 \, me/l$$

सिंचाईजल के आर एस सी (अविशष्ट सोडियम कार्बोनेट) की कौन सी सुरक्षित सीमा वैज्ञानिक ईटन (1950) द्वारा प्रस्तावित हुई है ?

- (1) < 1.25 मिली इक्वियैलेंट प्रति लिटर
- (2) > 2.5 मिली इक्विवैलेंट प्रति लिटर
- (3) < 5 मिली इक्विवैलेंट प्रति लिटर
- (4) > 7.5 मिली इक्विवैलेंट प्रति लिटर

11	The	disease resistance in plants is	impa	rted by :
	(1)	Potassium	(2)	Molybdenum
	(3)	Nitrogen	(4)	Manganese
	पौधों	में रोगप्रतिरोधकता किस तत्व से	आती	है ?
	(1)	पोटैशियम	(2)	मोलिब्डेनम
	(3)	नाइट्रोजन	(4)	मैंगनीज
12	The	deficiency symptoms of Calcium	and I	Boron are generally observed on:
	(1)	Young leaves in terminal bud	l	
	(2)	Older leaves		
	(3)	Lower leaves		
	(4)	Older and New leaves		
	कैल्सि	यम एवं बोरॉन की कमी के लक्षण	साध	ारणतः दिखाई देते हैं :
	(l)	शीर्ष कलिकाओं की तरुण पत्तियों	पर	
	(2)	पुरानी पत्तियों पर		
	(3)	निचली पत्तियों पर		
	(4)	पुरानी एवं तरुण पत्तियों पर		
13	Appl	ication of muriate of potash is	s gen	erally not recommended for :
	(1)	Wheat, Barley, Mustard		
	(2)	Bajra, Sorghum, Maize		
	(3)	Sugarcane, Sugarbeet, Tobacco	o	
	(4)	Groundnut, Sesamum		
	साधाः	रणतः किन फसलों में म्यूरेट ऑफ	पोटाश	के अनुप्रयोग की अनुशंसा नहीं की
	जाती	है ?		
	(1)	गेहूँ, जौ, सरसों		
	(2)	बाजरा, ज्वार, मक्का		
	(3)	गन्ना, चुकन्दर, तम्बाकू		
	(4)	मूंगफली, तिल		
94_A	.]	5		[Contd

14	Dian	nmonium phosphate contains	;	
	(1)	46% N and 18% P_2O_5	(2)	18% N and 46% P ₂ O ₅
	(3)	20% N and 20% $\mathrm{P_2O_5}$	(4)	18% N and 20% P_2O_5
	डाइअ	मोनियम फॉस्फेट में पाया जाता है	; ;	
	(1)	46% N एवं 18% P ₂ O ₅	(2)	18% N एवं 46% P ₂ O ₅
	(3)	20% N एवं 20% P ₂ O ₅	(4)	18% N एवं 20% P ₂ O ₅
15	The	essential constituent of Chlor	rophyll	is:
	(1)	Calcium	(2)	Sulphur
	(3)	Nitrogen	(4)	Iron
	पर्णह	रित का आवश्यक अवयव है :		
	(1)	कैल्सियम	(2)	गंधक
	(3)	नाइट्रोजन	(4)	लोहा
16	The	"Khaira disease" of paddy is	mainly	due to the deficiency of:
	(1)	Iron	(2)	Manganese
	(3)	Zinc	(4)	Copper
	धान	में ''खैरा रोग'' मुख्यतया किस	तत्व की	कमी से होता है ?
	(1)	लोहा	(2)	मैंगनीज
	(3)	जस्ता	(4)	ताँबा
17	Whi	ch of the fertilizer contains of	citric ac	cid soluble phosphoric acid ?
	(1)	Basic slag	(2)	Rock phosphate
	(3)	Single super phosphate	(4)	Triple super phosphate
	कौन	से उर्वरक में साइट्रिक अम्ल में	घुलनशील	ा फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है ?
	(1)	बेसिक स्लेग	(2)	रॉक फॉस्फेट
	(3)	सिंगल सुपर फॉस्फेट	(4)	ट्रिपल सुपर फॉस्फेट
94	Al	e	6	[Contd

18	Odd out from the following which	does	not relate to chain survey.
	(1) Metric chain	(2)	Jacob's chain
	(3) Gunter's chain	(4)	Engineer's chain
	निम्न में से कौन सा चेन सर्वेक्षण से स	सम्बन्धि	त नहीं है ?
	(1) मेट्रिक चेन	(2)	जेकब चेन
	(3) गुन्टेर चेन	(4)	इंजिनियर चेन
19	Which of the following field is lar	rgest	?
	(1) Field-A: 10 square kilometer	r (2)	Field-B: 100 hectare
	(3) Field-C: 625 acre	(4)	Field-D: 2500 vigha
	निम्न में से कौन सा फील्ड सबसे बड़ा	है ?	
	(1) फील्ड-A : 10 स्क्वायर किलोमीटर	(2)	फील्ड-B : 100 हेक्टर
	(3) फील्ड-C : 625 एकड़	(4)	फील्ड-D : 2500 बीघा
20	Which one of the following is the	lates	st survey equipment ?
	(1) DGPS	(2)	Theodolite
	(3) Total survey station	(4)	Dumpy level
	निम्न में से कौन सा आधुनिक सर्वेक्षण	उपकर	.ण है ?
	(1) डी.जी.पी.एस.	(2)	थीओडोलाइट
	(3) टोटल सर्वे स्टेशन	(4)	डम्पी लेवल
21	The line joining the places having	equa	l rainfall is called -
	(1) Isobaths	(2)	Isohyets
	(3) Isotherms	(4)	Contours
	समान वर्षा होने वाले स्थल को जोड़ने	वाली	रेखा कहलाती है —
	(1) आइसोबाथ	(2)	आइसोहाइट
	(3) आइसोथर्म	(4)	कोन्टुर
0.4	.1		101
94_A	A] 7		[Contd

94_ <i>A</i>	. 1	8		[Contd
	(3)	सवहनी चक्रवात	(4)	रिवर्स चक्रवात
	(1)	तुफान	(2)	प्रति चक्रवात
	उष्णव	हिटबन्धिय चक्रवात को यह भी का	हा जात	ग है :
	(3)	convective cyclone	(4)	reverse cyclone
	(1)	hurricane	(2)	anticyclone
25	Trop	sical cyclone is called as:		
	(3)	$T=(p)^{1/2}$	(4)	T=N+1/m
	(1)	T=1/P	(2)	T=K ⋅ p
		है -		
	वर्षाक	जल के रिटर्न समय अथवा रिकरन्स	इन्टर	वेल को इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया
	(3)	$T=(p)^{1/2}$	(4)	T=N+1/m
	(1)	T=1/P	(2)	$T=K \cdot p$
24	Recu	urrence interval or return perio	d of a	a rainfall event is expressed as -
	(4)	घन मीटर प्रति सेकण्ड		
	(3)	धन मीटर प्रति एकीय जलग्रहण	বাস	
	(2)		مره	
	(1)	जलग्रहण क्षेत्र में औसत गहराई घन मीटर		
			।• अपा	सत्त ।श्रमा याता ६ ःः
	` '	ा। ७४ । विश्लेषण में जल घनत्व को प्राय	ा ग≂ि	र्भन किया जाता है
	(3) (4)	m ³ /unit area of the watershed m ³ /s	J	
	(2)	m ³ /unit area of the watersho	A.	
	(1)	Average depth over the catch	nment	
23	•	ydrologic analysis the volume		nter is often expressed as -
	, ,	·		
	(3)	पृथ्वी	(4)	वातावरण
	(1)	महासागर	(2)	झील
	जलीय	। चक्र के वर्णन हेतु सबसे सुविधा	जनक	प्रारंभिक बिन्दु है –
	(3)	earth	(4)	atmosphere
	(1)	ocean	(2)	lake
22	A co	onvenient starting point to des	cribe	the hydrologic cycle is in the -

94_	4]	9		[Contd
	(4)	गहरी बालूई मिट्टी		
	(3)	निश्चित ऊसर भूमि		
	(2)	भारी प्लास्टिक चिकनी मिट्टी		
	(1)	चिकनी एवं उत्थल बालुई मिट्टी		
	जलीर	य मिट्टी समूह-सी में होता है -		
	(4)	deep sand		
	(3)	certain saline soil		
	(2)	heavy plastic clay		
	(1)	clay loam and shallow sandy		1
28	Hyd	rologic soil group-C contains -		
	(3)	अत्यधिक कटाव	(4)	भूगर्भिक कटाव
	(1)	अविश्वसनीय कटाव	(2)	हल्का कटाव
	वह र	कटाव जिसकी तीव्रता 0.5 से 5 ध	न मीट	तर/हैक्टर/वर्ष है, को माना जाता है ⊷
	(4)	geological erosion		
	(3)	severe erosion		
	(2)	slight erosion		
	(1)	insignificant erosion		
27	An e		om 0	0.5 to 5 m ³ /ha/year is considered
	(3)	वन भूमि	(4)	घास भूमि
		कृषि भूमि		रिक्त भूमि
		का अपवाह गुणांक अधिक होता है	?	
	(3)	forest lands	(4)	grass lands
	(1)	agriculture lands	(2)	barren lands
26	Run	-off coefficient is higher of -		

94_A	k]	10		[Contd
	(3)	अनुमान्य ढलान लम्बाई	(4)	इकाई ढलान लम्बाई
	(1)	अधिकतम ढलान लम्बाई	(2)	क्रान्तिक ढलान लम्बाई
	ढलान	लम्बाई की सीमा जिस पर मिट्टी	का क	टाव शुरू होता है, कहा जाता है –
	(3)	allowable slope length	(4)	unit slope length
	(1)	optimum slope length	(2)	critical slope length
31	The	limit of slope length at which	soil	erosion begins at called as -
	(3)	भूमि ढलान के मध्य में	(4)	भूमि ढलान की सम्पूर्ण लम्बाई में
	(1)	भूमि ढलान के निचले क्षेत्र में	(2)	भूमि ढलान के ऊपरी क्षेत्र में
	खूंड	अपरदन सामान्यतः शुरू होता है -	_	
	(3)	middle of land slope	(4)	entire length of land slope
	(1)	lower part of land slope	(2)	upper part of land slope
30	Rill	erosion usually begins in the	-	
	(4)	वह क्षेत्र जहाँ कई दशकों से बस्त	नी बस	ाई गई हो
	(3)	कृषि क्षेत्र जहाँ भू संरक्षण उपाय	अपना	ए गए हो
	(2)	अत्यधिक ढलाऊ उष्णकटीय वर्षा	वन क्षे	त्र में
	(1)	कम औसत वार्षिक वर्षा के क्षेत्र	में भा	री वर्षा (एक वर्षा समय में)
	निम्न	में से कौन सी परिस्थिति अत्यधिव	ह भूमि	कटाव का कारण है ?
	(4)	An area that has been urbani	ized f	or several decades or more.
	(3)	An agricultural region whe implemented.	ere so	oil conservation practices are
	(2)	Steep slopes in a tropical rai	nfores	st.
	(1)	Heavy rainfall (from a single strainfall.	torm)	in an area of low average annual
29	Whic	ch of the following conditions	would	I lead to the most soil erosion?

32	Erosion intensity of sheet and wir	nd erc	osion is expressed as -
	(1) m ³ / ha	(2)	tons / ha
	(3) m^3 / s	(4)	both (1) and (2)
	पर्त तथा वायु कटाव की अपरदन तीव्र	ता को	व्यक्त किया जाता है
	 घन मीटर प्रति हैक्टर 	(2)	टन प्रति हैक्टर
	(3) धन मीटर प्रति सेकण्ड	(4)	दोनों (1) व (2)
33	Longitudinal slope of gully bed is slope. It is generally found in cas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(1) V-shaped gully	(2)	U-shaped gully
	(3) inactive gully	(4)	active gully
	अवनालिका तल का अनुदैर्घ्य ढलान सटी भू इस अवनालिका में पाया जाता है –	मि के व	लगभग समानान्तर होता है यह सामान्यतः
	(I) वी आकार अवनालिका	(2)	यू आकार अवनालिका
	(3) निष्क्रिय अवनालिका	(4)	सक्रिय अवनालिका
34	In surface creep process the transp	ortati	on of soil particles varies from -
	(1) 3 to 38%	(2)	55 to 72%
	(3) 80 to 90%	(4)	7 to 25%
	सतह विसर्पण प्रक्रिया में मृदा कणों का	परिव	हन इसके बीच होता है –
	(1) 3 से 38 प्रतिशत	(2)	55 से 72 प्रतिशत
	(3) 80 से 90 प्रतिशत	(4)	7 से 25 प्रतिशत
35	K.E. > 25 index method for comp not consider the rainfall of intensi	_	rainfall erosivity factor (R), does
	(1) more than 25 mm/h	(2)	25 mm/h
	(3) less than 25 mm/h	(4)	30 mm/h
	वर्षा कटाव कारक (आर.) गणना के लि	राए उप	योगी सारणी विधि K.E. > 25 किस
	वर्षा की तीव्रता पर लागू नहीं होता ?	•	
	(1) 25 मिलीमीटर प्रति घण्टा से अधि	धक	
	(2) 25 मिलीमीटर प्रति घण्टा		
	(3) 25 मिलीमीटर प्रति घण्टा से कम	ī	
	(4) 30 मिलीमीटर प्रति घण्टा		
94_,	A] 11		[Contd

94_A	.]	12		[Contd
	(3)	सकल मृदा क्षरण	(4)	औसत वार्षिक तलछट उपज
	(1)	मासिक तलछट	(2)	औसत वार्षिक मृदा हानि
	संशोधि	ात सर्वाभौमिक मृदा हानि समीकरण	सेग	ाणना की जाती है –
	(3)	gross soil erosion	(4)	average annual sediment yield
	(1)	monthly sediment yield	(2)	average annual soil loss
39	Revis	ed Universal Soil Loss Equation	on (R	RUSLE) estimates -
	(3)	2 से 2.5 मीटर प्रति सेकण्ड	(4)	2.5 से 3 मीटर प्रति सेकण्ड
	(1)	1.5 मीटर प्रति सेकण्ड	(2)	2.0 मीटर प्रति सेकण्ड
	अच्छी	घास से आच्छादित पथान्तरी निका	स नाल	ी में प्रवाह वेग की सीमा है –
	(3)	2 to 2.5 m/s	(4)	2.5 to 3 m/s
	(1)	1.5 m/s	(2)	2.0 m/s
38	_	permissible flow velocity for de od grass cover is taken as -	esign	of diversion drains to be under
	(3)	भूरी मिट्टी	(4)	अत्यधिक पारगम्य मिट्टी
	(1)	महिन और काली मिट्टी	(2)	चिकनी बलुई मिट्टी
	जाता		וצרו	प्राच्या स्थापना <u>.</u>
	` '	अतः सम्मोचय बंध निम्न प्रकार की	` ,	
	` ,		(2) (4)	highly permeable soil
37	_	eneral the contour bunding is purchased clayey and black cotton soil		ed in all type of soil except -
	(3)	1000 हेक्टर सेन्टीमीटर	(4)	10 क्यूबिक किलोमीटर
	(1)	100 हेक्टर सेन्टीमीटर	(2)	। क्यूबिक किलोमीटर
	जल उ	भपवाह आयत्तन 1000 MCM (मिलि	ायन व	यूबिक मीटर) निम्न के बराबर है
	(3)	1000 ha. cm	(4)	10 cubic kilometer
	(1)	100 ha. cm	(2)	1 cublic kilometer
36	The r	unoff water volume of 1000 Me	CM (I	Million Cubic Meter) equals to -

40	In India, among the major and n non-Himalayan categories, how ma		•
	(1) 25	(2)	7
	(3) 18		15
	भारत में हिमालय और गैर-हिमालय दो बीच कितने प्रकार के बाढ़ प्रणव क्षेत्र		_ ,
	(1) 25	(2)	7
	(3) 18	(4)	15
41	Double row brush wood check dams the gullies of -	are e	conomically constructed to control
	(1) 1.5 to 2.1 m width	(2)	1.5 to 2.1 m depth
	(3) 5 to 10 m depth	(4)	3 to 5 m depth
	द्वि-पंक्तिय ब्रश वुड अवरोध बंध अवन	गालिका	के नियंत्रण हेतु बनाये जाते हैं -
	(1) 1.5 से 2.1 मीटर चौड़े	(2)	1.5 से 2.1 मीटर गहरे
	(3) 5 से 10 मीटर गहरे	(4)	3 से 5 मीटर गहरे
42	Drop inlet and chute spillways co	nsist	of -
	(1) inlet and outlet	(2)	inlet, conduit and outlet
	(3) weir and outlet	(4)	earth dam and outlet
	ड्राप इनलेट एवं शूट स्पिल वे में होता	है -	
	(1) इनलेट और आउटलेट	(2)	इनलेट, कन्डूट और आउटलेट
	(3) वेयर और आउटलेट	(4)	अर्थडेम और आउटलेट
43	In LUCC system, the sub-classes	indica	ates the problem of -
	(1) soil type	(2)	major land use
	(3) slope	(4)	slope length
	भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण (LUCC इंगित करती है –) के ज	अन्तर्गत उपवर्ग कक्षा, इस समस्या को
	(1) मिट्टी प्रकार	(2)	वृहद् भूमि उपयोग
	(3) ढाल	(4)	ढाल की लम्बाई
94	A) 13	3	[Contd

44	Strip cropping technique for erosion control is more effective when it is practiced under -			
	(1)	crop rotation	(2)	bunding
	(3)	terracing	(4)	single cropping system
		ार खेती तकनीक भूमि कटाव हेतु ाया जाए –	अधिक	प्रभावी है यदि इसे इसके साथ
	(1)	फसल चक्र	(2)	मेड़बन्दी
	(3)	वेदिकाएँ	(4)	एकीय फसल पद्धति
45	6		1	
45		tour bund length in meter per		
	(1)	10000 / HI	(2)	S / EI × 100
	. ,	VI/S×100	(4)	
		चय मेड की लम्बाई मीटर प्रति हैव		
	(1)	10000 / HI	(2)	S / EI × 100
	(3)	VI / S × 100	(4)	HI / S × 100
46	Soil	erodibility nomograph was de	erived	by -
	(1)	Wischmeir et al (1971)		
	(2)	Williams (1964)		
	(3)	Wischmeir and Smith (1978)	•	
	(4)	Kenneath et al (1991)		
	मिट्टी	इरोडेबीलिटी नोमोग्राफ इसके द्वारा	दिया	गया था —
	(1)	Wischmeir et al (1971)		
	(2)	Williams (1964)		
	(3)	Wischmeir and Smith (1978))	
	(4)	Kenneath et al (1991)		
94_	A J	14		[Contd

47	The evaporation pan coefficient	of class-A pan is generally taken	as -
	(1) 7.0	(2) 0.70	
	(3) 0.07	(4) 1.2	
	क्लास-A पान में सामान्यतः वाष्पन प	ान गुणांक का मान होता है	
	(1) 7.0	(2) 0.70	
	(3) 0.07	(4) 1.2	
48	The most suitable structure for regions of Southern Rajastan is	drainage line treatment followed	in all
	(1) Loose stone check dam	(2) Graded bund	
	(3) Contour bund	(4) PRT	
	दक्षिणी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में जल संरचना है –	निकास नाली उपचार के लिए सबसे उ	पयुक्त
	(1) अबद्ध पत्थर बंध	(2) प्रवणित बंध	
	(3) समौच्चय बंध	(4) पी.आर.टी.	
49	of water harvesting is known as (1) Culvert (3) Farm pond	onstructed across a nala for the pu - (2) Anicut (4) Percolation tank र्मित चिनाई युक्त पक्की संरचना को उ	
	जाता है –	·	
	(1) कलवर्ट	(2) ऐनीकट	
	(3) फॉर्म पौण्ड	(4) अन्तःस्रवण तालाब	
50	An imaginary line on which the known as -	reduce level is same at all the poi	nts is
	(1) ridge line	(2) valley line	
	(3) straight line	(4) contour line	
	एक काल्पनिक रेखा जिसके समस्त बिन्दु	ओं पर तल माप एक ही हो कहा जाता	है -
	(1) रिज लाइन	(2) वेली लाइन	
	(3) स्ट्रेट लाइन	(4) कन्टूर लाइन	
94_	A]	5 [Co	ntd

51	If the 1 mm rain water is infiltrated then total volume of water infiltra	through ground surface of 1 ha field, ted into the ground will be -
	$(1) 1 m^3$	(2) 10 m^3
	(3) 100 m^3	(4) 1000 m ³
	यदि । मिमी. वर्षा जल भूमि की सतह	द्वारा 1.0 हेक्टर क्षेत्र में अन्तःस्पंदन होता
	है तो भूमि में कुल कितना जल अन्तःस	
	(1) । मीटर ³	(2) 10 मीटर ³
	(3) 100 मीटर ³	(4) 1000 मीटर ³
52	The following watershed gives high	est peak discharge for the same area -
	(1) Fern shaped	(2) Fan saped
	(3) Square shaped	(4) Rectangular shaped
	एक समान क्षेत्रफल वाले निम्न में से कौ	नि सा वाटरशेड अधिकतम बहाव दर देगा?
	(1) फर्न आकार का	(2) फेन आकार का
	(3) वर्गाकार	(4) आयताकार
53	The time required to move the wa	ater from remotest point of watershed
	(1) unit duration	(2) run-off duration
	(3) time of concentration	` '
		कास बिन्दु तक जल स्थानान्तरण हेतु आवश्यक
	समय को कहते है –	
	(1) यूनिट अवधि	(2) अपवाह अवधि
	(3) समय का संकेन्द्रण	(4) प्रभावी वर्षा
54	For any watershed the values of s	sediment delivery ratio is always -
	(1) more than 1	(2) 1
	(3) less than 1	(4) 2.5
	किसी भी जलग्रहण क्षेत्र के तलछट डिले	विवरी अनुपात का मान हमेशा होता है –
	(1) एक से अधिक	(2) एक
	(3) एक से कम	(4) 2.5
94	Al 16	[Contd

94	A]	17	,		[Contd
	(4)	मूँगफली, धान और गेहूँ			
	(3)	मक्का, बाजरा और ज्वार			
	(2)	बाजरा, धान और सोयाबीन			
	(1)	कपास, धान और गेहूँ			
	निम्निलिखित में से किस समूह की फसलें सी -4 पादप हैं $$?				
	(4) Peanut, rice and wheat				
	(3)	Maize, pearlmillet and sorgh	um		
	(2)	Pearlmillet, rice and soyabea	ın		
	(1)	Cotton, rice and wheat	-	· -	
57	Whi	ch of the following set of cro	ops co	ontains C ₄ plants ?	
	(3)	निकास घनत्व	(4)	इलोन्गेशन अनुपात	
	(1)	फॉर्म फेक्टर	(2)	बेसिन आकार गुणांक	
	जलग्र	ाहण संरचना को प्रायः इसके द्वारा	प्रदर्शि	त करते हैं –	
	(3)	Drainage density	(4)	Elongation ratio	
	(1)	Form factor	(2)	Basin shape factor	
56	The	shape of the watershed is ge	nerally	y expressed by -	
	(3)	5 से 7 प्रतिशत	(4)	3 से 6 प्रतिशत	
	(1)	8 से 15 प्रतिशत	(2)	2 से 3 प्रतिशत	
	मध्यग	न अवनालिका का पार्श्व ढलान इस	के बीच	व होता है	
	(3)	5 to 7%	(4)	3 to 6%	
	(1)	8 to 15%	(2)	2 to 3%	
55	Side	slope of medium gullies vari	es fro	om -	

58	When two or more crops are grown simultaneously but do not have inter- competition effects are called -			
	(1) turf crops		(2)	companion crops
	(3) brake crop	os	(4)	parallel crops
	जब दो या दो से	अधिक फसलें साथ⊸	प्ताथ उ	गाई जाती हैं, लेकिन उनमें
	अन्तर–प्रतिस्पर्धात्मव	क प्रभाव नहीं होता, व	हलाती	हैं
	(1) टर्फ फसलें		(2)	सहचर फसलें
	(3) ब्रेक फसलें		(4)	समानान्तर फसलें
59	-	, in which the plumu the soil is called :	le is p	oushed upward and the cotyledon
	(1) Epigeal g	ermination	(2)	Negative germination
	(3) Hypogeal	germination	(4)	Induced germination
	_	प्राँकुर (plumule) ऊप रुके रहते हैं, को कर		भोर धकेल दिया जाता है और बीजपत्र —
	(1) 'इपीजिअल'	अंकुरण	(2)	ऋणात्मक अंकुरण
	(3) 'हाझोजिअल'	अंकुरण	(4)	'इन् ड ्यूज्ड' अंकुरण
60	Restorative crop	os are those crops	which	-
	(1) provide a	good harvest along	with	amelioration of the soil.
	(2) on growin	ng leave the field e	xhaust	ed.
	(3) are able t	o protect the soil s	urface	from erosion.
	(4) are grown	for temporary stor	ing.	
	पुनःप्रतिष्ठित फसल	नें उन्हें कहते हैं जो वि	के -	
	(1) काटने पर	अच्छी उपज के साथ-र	ताथ मृद	दा सुधारक का भी कार्य करती हैं।
	(2) उगाने पर	खेत को निढाल (श्रान्त) बना	देती हैं ।
	(3) अपरदन से	मृदा सतह की रक्षा	करने मे	में सक्षम होती हैं ।
		म से संग्रह हेतु उगाई		_
94_A	ı]	18		[Contd

94_	A] 19	1	[Contd
	(3) जिया मेज सैकरेटा स्टर्ट	(4)	जिया मेज ट्यूनीकेटा स्टर्ट
	(1) जिया मेज़ इन्हेन्टेटा स्टर्ट	(2)	जिया मेज एवर्टा स्टर्ट
	पॉप कॉर्न कहलाता है –		
	(3) Zea mays saccharata sturt.	(4)	Zea mays tunicata sturt.
	(1) Zea mays indentata sturt.	(2)	Zea mays averta sturt.
63	Pop corn is -		
	(3) सतत शस्यन	(4)	चक्रीय शस्यन
	(1) बहुफसली	(2)	दोहरी शस्यन
	एक कृषि वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र में चने के प्रक्रम में खेती करने को कहते		ान के बाद गेहूँ अथवा ज्वार के बाद
	(3) continuous cropping	(4)	rotational cropping
	(1) multiple cropping	(2)	double cropping
62	If paddy followed by wheat or so in a succession on a piece of lan	_	
	(3) पेड़ी शस्यन	(4)	बहुमंजली शस्यन
	(1) अन्तर शस्यन	(2)	रिले शस्यन
	प्रति वर्ष चार फसलों को एक ही खेत कटने से पहले उत्तरवर्ती फसल बो दी		
	(3) ratoon cropping	(4)	multi-storeyed cropping
	(1) inter cropping	(2)	relay cropping
61	Growing of four crops per year in another crop before the previous of		•

64		ch of the weed is controlled by bio-agent?	y the	use of Zygogramma bicolorata
	(1)	Prickly pear / Opuntia sp.	(2)	Xanthium strumarium
	(3)	Lantana camera	(4)	Parthenium hysterophorus
		लेखित में से किस अपतृण के नियं <i>ोलोरेटा</i> का प्रयोग किया जाता है		तु जैवकारक के रूप में ' <i>जाइगोग्रेमा</i>
	(1)	नागफनी	(2)	जैन्थियम स्ट्रमेरियम
	(3)	लेन्टाना केमैरा	(4)	गाजर घास
65	Whic	ch of the following is an exar	nple	of mimicry weed ?
	(1)	Green gram RMG-344 in gre	en gr	am RMG-492 crop
	(2)	Black gram in green gram cr	ор	
	(3)	Chenopodium murale in berse	eem o	гор
	(4)	Phalaris minor in wheat crop)	
	निम्नि	लेखित में से कौन सा अनुकरणीय	अपतृष	ग का उदाहरण है ?
	(1)	मूँग RMG-492 की फसल में मूँ	η RM	IG-344 के पौधे
	(2)	मूँग की फसल में उड़द के पौधे		
	(3)	<i>चीनोपोडियम मुरेल</i> बरसीम की फ	सल मे	•
	(4)	गेहूँ की फसल में फेलेरिस माइनर	-	
66		oicide used to control 'Orobana' is -	che a	egyptiaca' parasite in mustard
	(1)	pendemethalin and fluchlorali	n	
	(2)	alachlor and bentazon		
	(3)	nitrofen and trifluralin		
	(4)	MSMA and DSMA		
		í की फसल में 'ओरोबंकी इजिप्टिएका नाशी है :	' नाम	क परजीवी के नियंत्रण के लिये प्रयुक्त
	(1)	पैन्डीमिथालीन व फ्लूक्लोरेलिन	(2)	एलाक्लोर व बैन्टोजोन
	(3)	नाइट्रोफेन व ट्राइफ्लूरालीन	(4)	एम.एस.एम.ए. व डी.एस.एम.ए.
94_4	A]	20		[Contd

67	S a s a special	ding.	type groundnut variety?
	(1) A. K. 12-24	(2)	R. G. 141
	(3) T. G. 37A	(4)	R.G. 382
	निम्नलिखित में से मूँगफली की कौन सी	फैल	ने वाली किस्म है ?
	(1) ए.के. 12-24	(2)	आर.जी. 141
	(3) टी.जी. 37A	(4)	आर.जी. 382
68	Most commonly used herbicide in gand broad leaved weeds is -	ground	lnut fields to control both annual
	(1) Fluchloratin	(2)	Atrazine
	(3) Alachlor	(4)	2, 4–D
	मूंगफली में चौड़ी पत्ती वाले तथा एकर्वा सामान्यतया उपयोग में आने वाला शाक		
	(1) फ्लूक्लोरेलिन	(2)	एट्राजिन
	(3) एलाक्लोर	(4)	2, 4–D
69	-F		
	(1) Melochia corchorifolia	` ,	Oxalis corniculata
	(3) Vicia sativa		Cleoma viscosa
	जंगली सरसों नामक खरपतवार का वैज्ञ	ानिक	नाम है :
	(1) मेलोचिया कोरकोरिफोलिया	(2)	ऑक्सेलिस कोरनीक्यूलेटा
	(3) विसिया सटाइवा	(4)	विलओमा विस्कोसा
70	Which of the following is not the	sele	ctive herbicides ?
	(1) 2, 4–D	(2)	Simazine
	(3) Paraquat	(4)	Butachlor
	निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी च	यनात्म	क नहीं है ?
	(1) 2, 4–D	(2)	सिमाजिन
	(3) पेराक्वोट	(4)	ब्यूटाक्लोर
94_	A] 21		[Contd

71	Which disease of pearlmillet contains toxic alkaloids harmful to health?			
	(1) Rust	(2) Downy n	nildew	
	(3) Ergot	(4) Smut		
	स्वास्थ्य के प्रति विष-जन्य 'ऐल्केलाड्स'	बाजरे के किस	रोग में पाये जाते हैं ?	
	(1) किट्ट रोग	(2) मृदुरोमिल	आसिता रोग	
	(3) अर्गट	(4) कण्ड रोग		
72	Seed rate (kg/ha.) of pearlmillet in	Rajasthan is –		
	(1) 2 kg	(2) 6 kg		
	(3) 5 kg	(4) 4 kg		
	राजस्थान में बाजरे की बीज दर (कि.ग्र	प्रति हैक्टर) है	_	
	(1) 2 कि.ग्रा.	(2) 6 कि.ग्रा.		
	(3) 5 कि.ग्रा.	(4) 4 कि.ग्रा.		
73	Inter and intra row spacing of bla	k gram is mai	ntained as -	
	(I) 25 cms and I0 cms	(2) 30 cms a	and 10 cms	
	(3) 40 cms and 10 cms	(4) 20 cms a	and 20 cms	
	उड़द की फसल की अन्तरा एवं अन्तः	क्ति की दूरी हो	ती है –	
	(1) 25 सें.मी. और 10 सें.मी.	(2) 30 सें.मी.	और 10 सें.मी.	
	(3) 40 सें.मी. और 10 सें.मी.	(4) 20 सें.मी.	और 20 सें.मी.	
74	In which of the following crop, nip and promote the lateral branching	-	stop the apical growth	
	(1) Pearlmillet	(2) Green gr	am	
	(3) Bengal gram	(4) Mustard		
	निम्नलिखित फसलों में से किस फसल में जिससे कि पौधे की शीर्षस्थ वृद्धि अवरुद्ध			
	(1) बाजरा	(2) मूँग		
	(3) चना	(4) सरसों		
94_ <i>A</i>	A] 22		[Contd	

75 The optimum temperature for germination and vegetative growth of wheat is:

	Germinat	ion ↓	Vegetative growth	
	°С		o.C	
(1)	10-13	and	8–12	
(2)	14–19	and	13–15	
(3)	20–22	and	16–22	
(4)	23-25	and	28–35	
गेहूँ	के अंकुरण	व वानस्पतिक	वृद्धि के लिये इष्टतम तापमान है -	-
	अंकुरण	\downarrow	वानस्पतिक वृद्धि	
	оC		∘C	
(1)	10–13	और	8–12	
(2)	14-19	और	13–15	
(3)	20–22	और	16–22	
(4)	23–25	और	28–35	
(-)	23 23	GIIV	20-33	

- 76 Which of the following state stands first in area and production of Bengal gram (chick pea) ?
 - (1) Madhya Pradesh (M.P.)
- (2) Maharashtra

(3) Rajasthan

(4) Uttar Pradesh (U.P.)

चने के क्षेत्रफल व उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है ?

- (1) मध्य प्रदेश (एम.पी.)
- (2) महाराष्ट्र

(3) राजस्थान

(4) उत्तर प्रदेश (यू.पी.)

94_A]

23

[Contd...

94	Al	24		{Contd
	(3)	कॅम्पैनियन क्रॉपिंग	(4)	मॉनो–क्रॉपिंग
	(1)	सोल क्रॉपिंग	(2)	क्रॉपिंग पैटर्न
	एक रि	नेश्चित भू-भाग में प्रतिवर्ष एक ह	ो फस	ल उगाने को कहते हैं –
	(3)	Companion cropping	(4)	Mono-cropping
	(1)	Sole cropping	(2)	Cropping pattern
79	Grow	ving only one crop year after	year	on a piece of land is called -
	(3)	मिश्रित शस्यन	(4)	अनुक्रमिक शस्यन
	(1)	चक्रीय शस्यन	(2)	सतत शस्यन
		ाजरे व मूँग के बीजों को मिलाकर ण है –	छिटक	वाँ विधि द्वारा बोया जाता है तो यह
	(3)	mixed cropping	(4)	sequential cropping
	(1)	rotational cropping	(2)	continuous cropping
78		the seeds of pearlmillet and casting method is an example	_	gram are mixed and sown by
	(3)	70 ग्राम	(4)	120 ग्राम
	(l)	20 ग्राम	(2)	40 प्राम
	भारतीर निम्न	य कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा प्र है –	ति व्य	क्ति दालों की निम्नतम सिफारिश
	(3)	70 gram	(4)	120 gram
	(1)	20 gram	(2)	40 gram
77	Minimum per capita pulses recommended by ICAR is -			

80		which of the following - critical rrigated, if water is available		th stages, the wheat crop should for two irrigations?
	(1)	Crown root initiation (CRI)	+ dou	gh
	(2)	Late tillering and flowering		
	(3)	Crown root initiation (CRI)	+ mil	king
	(4)	Late jointing and flowering		
	यदि केवल दो सिंचाइयों के लिये जल उपलब्ध है तो गेहूँ की निम्नलिखित में से कौन–कौन सी क्रान्तिक वृद्धि अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए ?			
	(1)	शीर्ष जड़ें जमने के समय + दान	ा सख्द	त बनते समय
	(2)	कल्ले फूटने की अंतिम अवस्था ।	- पुष्पः	न
	(3)	शीर्ष जड़े जमने के समय + दान	ों में व	दूध पड़ते समय
	(4)	गाँठ बनने की अंतिम अवस्था +	पुष्पन	
81		imum number of fruit plants o	ean be	e planted in the orchard by the
	(1)	Square	(2)	Triangular
	(3)	Hexagonal	(4)	Rectangular
	बगीच	ग लगानें की किस विधि में अधिक	तम प	धारोपण किया जा सकता है ?
	(1)	वर्गाकार	(2)	त्रिभुजाकार
	(3)	षट्भुजाकार	(4)	आयताकार
82	Whi	ch is known as "Teak of Raja	ısthan'	" ?
	(1)	Siris	(2)	Rohida
	(3)	Arjun	(4)	Neem
	कौन	''राजस्थान का टीक'' कहलाता है	?	
	(1)	सिरस	(2)	रोहिड़ा
	(3)	अर्जुन	(4)	नीम
94_A	A]	25		[Contd

94_	ΑĮ	26			[Contd
	(3)	बीकानेर में	(4)	भोपाल में	4
	(1)	बंगलोर में	(2)	बीजापुर में	
	केन्द्री	य शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है			
	(3)	Bikaner	(4)	Bhopal	
	(1)	Bangalore	(2)	Bijapur	
86	Cent	ral Institute for Arid-Horticultu	ıre is	situated at :	
	(3)	बेर	(4)	अनार	
	(1)	अमरुद	(2)	ऑवला	
	''भार	तीय गुजबेरी'' किस फल का नाम		u.	
	(3)	Ber	(4)	Pomegranate	
	(1)	Guava	(2)	Aonla	
85	A fr	uit called "Indian goosberry" i	s :		
	(~)		()		
	, ,	6.5 - 7.5	` `	7.5 - 8.5	
		3.5 - 5.5		4.5 - 6.5	
	` '	0.5 - 7.5 ॥न लगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा ग	` *		
	` '	6.5 - 7.5	, ,	7.5 - 8.5	
04		3.5 – 5.5		4.5 – 6.5	
84	Reet	soil for planting a fruit orcha	rd sh	ould have nH hetweer	
	(3)	बेल	(4)	ऑवला	
	(1)	अनार	(2)	अंगूर	
	निम्न	में से कौन सा शुष्क जलवायु का	फल	नहीं है ?	
	(3)	Bael	(4)	Aonla	
	(1)	Pomegranate	(2)	Grape	
83	Whic	h one of the following is not	an a	rid fruit ?	

94_ <i>A</i>			7	[Contd
	(3)	अमरुद	(4)	आम
	(1)	अनार	(2)	आँवला
	'चित्ति	ादार' एवं 'लखनऊ-49' निम्न में	से किर	प फल की किस्में है ?
	(3)	Guava	(4)	Mango
	(1)	Pomegranate	(2)	Aonla
90		ch of the following fruit croknow-49'?	p have	varieties 'Chitidar' and
	(3)	सूबबूल का	(4)	अरडू का
	(1)	खेजड़ी का	(2)	इजरायली बबूल का
	ल्यूके	<i>सिना ल्यूकेसीफेला</i> वानस्पतिक नाम	है :	
	(3)	Soobabool	(4)	Ardu
	(1)	Khejri	(2)	Israeli babool
89	Leuc	cacena leucocephala is the b	otanical	name of:
	(3)	केले में	(4)	बेर में
	(1)	आम में	(2)	खजूर में
	द्विवर्ष	िफलन एक मुख्य समस्या है :		
	(3)	Banana	(4)	Ber
	(1)	Mango	(2)	Datepalm
88	Bien	nial Bearing is one of the n	nost sei	rious problem in :
	(3)	अधिक प्रकाश संश्लेषण दक्षता	(4)	उपरोक्त सभी
	(1)	उच्च तापक्रम	(2)	अधिक ऑक्सीजन
	संरक्षि	त खेती में अधिक उत्पादन का	मुख्य का	ारण है :
	(3)	High photosynthetic efficien	icy (4)	All of the above
	(1)	High temperature	(2)	High O ₂
87	High	production in protective cul	ltivation	is due to:

91	Mridu	ula is a cultivar of :			
	(1)	Guava	(2)	Ber	
	(3)	Pomegranate	(4)	Aonla	
	मृदुला	किस फल की किस्म है ?			
	(1)	अमरुद	(2)	बेर	
	(3)	अनार	(4)	ऑवला	
92	Seedl	less variety of mango is :			
	(1)	Amrapali	(2)	Langra	
	(3)	Sindhu	(4)	Dashehari	
	आम	की बीज रहित किस्म है :			
	(1)	आम्रपाली	(2)	लंगङ्ग	
	(3)	सिन्धु	(4)	दशहरी	
93	Best	time of budding in ber is:			
	(1)	July-August	(2)	September-October	
	(3)	November-December	(4)	May-June	
	बेर मे	मं कलिकायन का सर्वोत्तम समय है	:		
	(1)	जुलाई-अगस्त	(2)	सितम्बर–अक्टूबर	
	(3)	नवम्बर–दिसम्बर	(4)	मई-जून	
94	In o	rafting lower part of plant is	lenover		
74	(1)	Stock	(2)	Apical	
	(3)	Bud	(4)	Scion	
		ंग में पौधे का निचला भाग जाना			
				_	
	(1)	स्टॉक	(2)	एपिकल	
	(3)	कलिका	(4)	सॉयन	
94_ <i>A</i>	k]	28			[Contd

	(1) इनार्चिंग द्वारा	(2)	लेयरिंग द्वारा
	(3) बीज द्वारा	(4)	टी-कलिकायन द्वारा
96	Commercial method of propagation	n in 1	mango is :
	(1) Vineer grafting	(2)	Seed
	(3) Budding	(4)	Cutting
	आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि	है :	
	(1) विनियर ग्राफ्टिंग	(2)	बीज
	(3) कलिकायन	(4)	कलम
97	Management of forest through pe	oples	participation is called :
	(1) Social forestry	(2)	Farm forestry
	(3) Agro-forestry	(4)	Joint forest management
	जन सहभागिता से वन प्रबन्धन को क	हते है	:
	(1) सामाजिक वानिकी	(2)	प्रक्षेत्र वानिकी
	(3) शस्य वानिकी	(4)	संयुक्त वन प्रबन्ध
94_A] 29 [Contd			
/ * _/	- L	•	[Contd

98	Fruit	cracking in pomegranate is di	ue to	deficiency, of:	
	(1)	Nitrogen	(2)	Zinc	
	(3)	Boron	(4)	Copper	
	अनार	में फल फटने का मुख्य कारण है	:		
	(1)	नत्रजन	(2)	जिंक	
	(3)	बोरॉन	(4)	कॉपर	
99	Fruit	fly is a major pest of:			
	(1)	Aonla	(2)	Pomegranate	
	(3)	Mango	(4)	Ber	
	फलमव	क्खी किसका मुख्य कीट है ?			
	(1)	ऑवला का	(2)	अनार का	
	(3)	आम का	(4)	बेर का	
100	Riche	est source of "Vitamin C" is			
	(1)	Pomegranate	(2)	Guava	
	(3)	Bael	(4)	Aonla	
	सर्वाधि	धक ''विटामिन–सी'' का स्रोत है ः			
	(1)	अनार	(2)	अमरुद	
	(3)	बेल	(4)	ऑवला	
94_A	k]	30			[Contd

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे काम के लिये जगह

94_A] 31 [Contd...

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे काम के लिये जगह

KEY ASSTT. SOIL CONSERVATION OFFICER (AGRICULTURE) FOREST DEPTT. 26/06/2013

K	EY ASST
SET_A	RES
1	1
2	1
3	3
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	2
10	1
11	1
12	1
	2
13	3 2
14	3
15	3
16	
17	2
18	
19	1
20	1
21	2
22	1
23	1
24	1
25	1
26	2
27	2
28	1
29	1
30	1
31	2
32	4
33	2
34	4
35	3
36	2
37	1
38	1
39	2
40	3
41	
42	2
43	2
44	1
45	1

NSERVAT	ON OFF
SET_A	RES
51	2
52	2
53	3
54	3
55	1
56	1
57	3
58	4
59	3
60	1
61	2
62	2
63	2
64	4
65	4
66	1
67	4
68	1
69	4
70	3
71	3
72	4
73	2
74	3
75	3
76	1
77	3
78	3
79	4
80	
81	3
82	3 3 2 2
83	2
84	3
85	3
86	3
87	3
88	1
89	3
90	3
90	3
91	3
93	1
94	1

95

46	1
47	2
48	1
49	2
50	4

96	1
97	1
98	3
99	4
100	4